

# Vorgehensweise: Wurzelgleichungen lösen

Zunächst muss bei einer quadratischen Gleichung  $x$  von der Wurzel befreit werden. Dies geschieht mittels der Quadratur der Gleichung. Dabei erhält man aber unter Umständen eine weitere Lösung, die die ursprüngliche Gleichung eventuell nicht löst. Die **Quadratur** ist demnach **keine äquivalente Termumformung**, bei der die Definitions- und Lösungsmenge immer konstant bleibt. Trotzdem hilft sie bei der Lösungsfindung. Man muss lediglich beachten, die gefundenen Lösungen durch eine Probe zu überprüfen.

Beispiel:

```
\begin{equation} \begin{aligned} \sqrt{2x+1} &= x-17 \quad \text{quadrieren} \\ 2x+1 &= (x-17)^2 \quad \text{Binom aulösen} \\ 2x+1 &= x^2 - 34x + 289 \quad \text{pq-Formel} \\ x_{1,2} &= -\frac{-36}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-36}{2}\right)^2 - 288} \quad \text{implies } x_1 = 12 \text{ und } x_2 = 24 \end{aligned} \end{equation}
```

```
\begin{equation} \begin{aligned} \text{Probe: } x_1 &= 12 \quad \sqrt{2 \cdot 12 + 1} = 12 - 17 \\ \sqrt{25} &= -5 \quad 5 = -5 \quad \text{falsch} \end{aligned} \end{equation}
```

```
\begin{equation} \begin{aligned} \text{Probe: } x_2 &= 24 \quad \sqrt{2 \cdot 24 + 1} = 24 - 17 \\ \sqrt{49} &= 7 \quad 7 = 7 \quad \text{wahr} \end{aligned} \end{equation}
```

Lösungsmenge  $L = \{24\}$

## Musteraufgabe

```
\begin{equation} \begin{aligned} \sqrt{x-9} &= 1 \quad \text{quadrieren} \\ x-9 &= 1 \quad \text{implies } x = 10 \end{aligned} \end{equation}
```

Aufgaben:			
a) $2 - \sqrt{x} = 1$	b) $\sqrt{x} - 2 = -3$	c) $\sqrt{4-x} = 2$	d) $\sqrt{x} - 8 = 2$
e) $\sqrt{4x-5} + 6 = 0$	f) $5 \cdot \sqrt{4x-5} = 20$	g) $5 - \sqrt{x-6} = 2$	h) $\sqrt{4x+6} = 5$
i) $\sqrt{2x+1} - 1 = -6$	j) $10 + \sqrt{2x-3} = 5$	k) $7 + \sqrt{5x+4} = 10$	

### Lösungen (unsortiert)

$L = \{1\}$ (kommt zweimal vor)	$L = \{100\}$	$L = \{15\}$	$L = \{-\frac{5}{4}\}$	$L = \{0\}$	$L = \{\frac{21}{4}\}$
$L = \{ \}$ (leere Menge; Quadratwurzel darf nicht negativ sein)					

## Aufwendigere Aufgaben zu

# Wurzelgleichungen

## Beispiel mit zwei gleichen Wurzeln:

Erst zusammenfassen, dann quadrieren und auflösen.

$$\begin{aligned} 5 \cdot \sqrt{x+1} - 1 &= 3 \cdot \sqrt{x+1} + 3 \quad \& \sim -3 \cdot \sqrt{x+1} \quad \& \sim +1 \\ 2 \cdot \sqrt{x+1} &= 4 \quad \& \sim :2 \quad \& \sim \text{quadrieren} \sim \sim -1 \quad \& x = 3 \\ 5 \cdot \sqrt{3+1} - 1 &= 3 \cdot \sqrt{3+1} + 3 \quad \& 5 \cdot 2 - 1 = 3 \cdot 2 + 3 \\ \sim \Leftrightarrow 9 &= 9 \quad \sim \sim \text{wahr} \sim \sim L = \{3\} \end{aligned}$$

## Beispiel mit unterschiedlichen Wurzeln

Erst Wurzel isolieren, dann beidseitig quadrieren und auflösen.

$$\begin{aligned} 3 \cdot \sqrt{4x+10} - 4 \cdot \sqrt{2x+6} &= 0 \quad \& \sim +4 \cdot \sqrt{2x+6} \quad \& \sim \text{quadrieren} \\ 9 \cdot (4x+10) &= 16 \cdot (2x+6) \quad \& \sim \text{auflösen} \\ 36x + 90 &= 32x + 96 \quad \& \sim -90 \quad \& \sim -32x \\ 4x &= 6 \quad \sim \Leftrightarrow x = 1,5 \quad \& \sim \text{Probe:} \\ 3 \cdot \sqrt{4 \cdot 1,5 + 10} - 4 \cdot \sqrt{2 \cdot 1,5 + 6} &= 3 \cdot \sqrt{16} - 4 \cdot \sqrt{9} = 3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 = 0 \quad \sim \sim \text{wahr} \sim \sim L = \{1,5\} \end{aligned}$$

## Beispiel mit unterschiedlichen Wurzeln und absolutem Element

Wurzeln nach einander durch quadrieren auflösen.

$$\begin{aligned} \sqrt{x-1} + \sqrt{x-4} - 3 &= 0 \quad \& \sim +3 \quad \& \sim -\sqrt{x-1} \\ \sqrt{x-4} &= 3 - \sqrt{x-1} \quad \& \sim \text{quadrieren} \\ x-4 &= (3 - \sqrt{x-1})^2 \quad \& \sim \text{2. Binom anwenden mit } a = 3 \text{ und } b = -\sqrt{x-1} \\ x-4 &= 9 - 6\sqrt{x-1} + (x-1) \quad \& \sim +6\sqrt{x-1} \\ \sim \text{Rest fällt weg} \quad \& \sim 6 \cdot \sqrt{x-1} = 12 \quad \& \sim :6 \quad \& \sim \text{quadrieren} \\ x-1 &= 4 \quad \& \sim \Leftrightarrow x = 5 \quad \& \sim \text{Probe:} \\ \sqrt{5-1} + \sqrt{5-4} - 3 &= 2 + 1 - 3 = 0 \quad \sim \sim \text{wahr} \sim \sim L = \{5\} \end{aligned}$$

Aufgaben mit aufwendigeren Wurzelgleichungen:		
a) $7 \cdot \sqrt{3x} - 1 = 5 \cdot \sqrt{3x} + 5$	b) $3 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}x+1} - 1 = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}x+1} + 1$	c) $3 \cdot \sqrt{3x-5} - 2 = 2 \cdot \sqrt{3x-5} + 2$
d) $\sqrt{\frac{3}{2}x+7} - \sqrt{\frac{1}{2}x+6} = 0$	e) $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{x+9} - \frac{1}{3} \cdot \sqrt{x+14} = 0$	f) $\sqrt{3x-7} - \sqrt{4x-9} = 0$
g) $5 \cdot \sqrt{3x-8} - \sqrt{7x+4} = 0$	h) $7 \cdot \sqrt{15x+4} - 3 \cdot \sqrt{50-3x} = 0$	i) $\sqrt{x+9} - \sqrt{x} = 1$

<b>Aufgaben mit aufwendigeren Wurzelgleichungen:</b>		
j) $\sqrt{4x-3} + 2 \cdot \sqrt{x} = 3$	k) $\sqrt{x+6} + \sqrt{x-3} = 9$	l) $\sqrt{2(x+1)} + \sqrt{2x+15} = 13$
<b>Lösungen (unsortiert)</b>		
$L=\{3\} L=\{7\} L=\{12\} x=2 L=\{\} L=\{6\} L=\{3\} L=\{\frac{1}{3}\} L=\{-5\} L=\{16\} L=\{1\} L=\{19\} L=\{17\}$		

From:

<https://www.kopfload.de/> - **kopfload** - Lad Dein Hirn auf!

Permanent link:

[https://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:mathe:arithmetik:einfuehr\\_wurzeln&rev=1467320720](https://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:mathe:arithmetik:einfuehr_wurzeln&rev=1467320720)

Last update: **2025/11/19 16:13**

