

Integralrechnung - Integrationskonstante C bestimmen

Erklärung des Problems

Bei der Bestimmung der Stammfunktion entstehen unendlich viele Stammfunktionen, die durch eine Konstante C zum Ausdruck kommen.


$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Für C kann jede beliebige Zahl aus **R** eingesetzt werden.

Wie kann man nun eine bestimmte Stammfunktion ermitteln?


Lösungsansatz

Betrachtet man eine beliebige integrierbare Funktion $f(x)$, dann kann man die dazugehörige Stammfunktionen $F(x)$ durch das unbestimmte Integral bestimmen.



(grüne Kurve: $f(x)=0,5x^5 - 4x^3 + 8x$ rote Kurve: $F(x) = \frac{1}{12} x^6 - x^4 + 4 x^2 + C$)

Zur besseren Verdeutlichung wurde ein Integral von $a=0$ bis $b=2,5$ (rosa hinterlegt) eingezeichnet. Die entsprechenden Flächen sind oberhalb abzulesen (Für das Intervall $[0;2,5] \rightarrow 6,283$) Dabei ist zunächst $C=0$ wie man am Durchlauf der roten Kurve durch den Ursprung $(0;0)$ erkennt. Durch Verändern der linken unteren Integrationsgrenze ($a=0$) auf den Wert $a=0,6$ (willkürlich). Hierdurch verschiebt sich die Kurve der Stammfunktion $F(x)$ um genau den Wert $1,314$ nach Unten (vgl. y-Achsenabschnitt von $F(x) = -1,314$ und damit Integrationskonstante $C = -1,314$ mit dem Wert der Fläche im Intervall $[0;0,6]=1,314$). Es ergibt sich also exakt der Wert der Fläche im Intervall $[0;a=0,6]$ als neuer negativer y-Achsenabschnitt bzw. C bei der Stammfunktion $F(x)$. s. orange Markierung in der



nächsten Abbildung:

Wie man an der gestrichelten Kurve (ursprünglichen Stammfunktion) sieht, ist die Form der Stammfunktion nicht verändert, sondern nur die Lage. Man kann auch umgekehrt über die Verschiebung der Stammfunktion die Integrationskonstante C ermitteln.

Aufgabenstellung

Gegeben ist ein Punkt $P(x_P, y_P)$, durch den die Stammfunktion laufen soll. Gesucht ist nun die Integrationskonstante C , die dies ermöglicht. Durch folgenden Ansatz kann C ermittelt werden.

Ansatz:

$$F(x_P) + C = y_P$$

(Einsetzen des Punktes P in die Stammfunktion)

Anschließend wird nach C aufgelöst.

Beispiel:

Gegeben: $f(x) = -3x^2 + 4x + 5$

Gesucht: Berechnen Sie die Integrationskonstante C der Stammfunktion $F(x)$, damit $F(x)$ durch den Punkt $P(1|4)$ verläuft.

Ansatz:

1. Zunächst wird die Stammfunktion $F(x)$ nach den bekannten Integrationsregeln bestimmt:

$$F(x) = -x^3 + 2x^2 + 5x + C$$

2. Koordinaten von P in $F(x)$ einsetzen, dann nach C auflösen:

$$F(1) + C = 4$$

$$\Leftrightarrow F(1) = -1^3 + 2 \cdot 1^2 + 5 \cdot 1 + C = 4 \Leftrightarrow C = 4 + 1 - 2 - 5 = -2$$

3. Ergebnis:

$$F(x) = -x^3 + 2x^2 + 5x - 2$$

From:

<https://www.kopfload.de/> - **kopfload - Lad Dein Hirn auf!**

Permanent link:

https://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:mathe:integral:konstante_c&rev=1585900546

Last update: **2025/11/19 16:13**

